

胃癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.1

担当看護師


薬剤部

患者氏名		歳	ID	担当医師
------	--	---	----	------

胃癌 切除不能癌 再発・転移 術後化学療法

身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
----	----	----	----	------	----------------

化学療法レジメン **TS-1/CDDP + Herceptin 療法 (SP + HER)**



TS-1	ティーエスワン	mg/m ²	mg/body
CDDP	シスプラチン	mg/m ²	mg/body
Trastuzumab	ハーセプチン	初回 8 mg/kg	mg/body
		2回目以降 6 mg/kg	mg/body

化学療法開始日 年 月 日 同意書作成
 注射投与経路 末梢血管確保 CVポート 予定回数 クール

薬剤	投与法	月/日								
		コース		コース		コース		コース		
		/	/	/	/	/	/	/	/	
		<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	
①	TS-1 mg	内服 2週間	←	→	←	→	←	→	←	→
②	ソルデム3A 500+ プリンペラン1A ×2本	12~24時間 メインルート day1	○		○		○		○	
③	ソルラクト500ml	2時間点滴 側管 day1	○		○		○		○	
④	プロイメンド150mg グラニセトロン1mg ボラミン 1A デキササート 9.9mg	30分点滴 側管 day1	○		○		○		○	
⑤	ハーセプチン 初回 mg 2回目~ mg 生食 250ml	初回90分点滴 2回目以降忍容 性良ければ30分 まで短縮可能	○		○		○		○	
⑥	シスプラチン mg 生食 250ml	2時間点滴 側管 day1	○		○		○		○	
⑦	ソルラクト500ml + ラシックス1/2A	2時間点滴 側管 day1	○		○		○		○	

胃癌化学療法スケジュール表

健和会大手町病院外科

No.2

担当看護師

薬剤部

患者氏名		歳	ID	担当医師
------	--	---	----	------

化学療法レジメン TS-1/CDDP + Herceptin 療法 (SP + HER)

薬剤容量変更 あり なし

TS-1	ティーエスワン	mg/m ²	mg/body
CDDP	シスプラチン	mg/m ²	mg/body
Trastuzumab	ハーセプチン	6 mg/kg	mg/body

注射投与経路 末梢血管確保 CVポート 予定回数 クール

①	薬剤	月/日									
		コース		コース		コース		コース		コース	
		<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
	TS-1	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→
②	ソルデム3A 500+ プリンペラン1A ×2本	○		○		○		○		○	
③	ソルラクト500ml	○		○		○		○		○	
④	プロイメンド150mg グラニセトロン1mg ボラミン 1A デキサート 9.9mg	○		○		○		○		○	
⑤	Trastuzumabハー セプチン	○		○		○		○		○	
⑥	CDDP シスプラチン	○		○		○		○		○	
⑦	ソルラクト500ml + ラシックス1/2A	○		○		○		○		○	

(備考)

※ Trastuzumab ハーセプチン 関連

- ・ HER 2陽性の定義 : IHC法 3+ または FISH法 陽性
- ・ infusion reaction : 発現率は40%。初回のTrastuzumab投与中または投与開始後24時間以内に多く現れる悪寒・発熱などの症状で、過敏反応と考えられている。重篤な場合はhydrocortisoneを投与する。
- ・ 心障害 : うっ血性心不全などの報告があり、LVEF 45%以上の心機能が望ましい。

※ CDDP 60mg/m² → 腎機能が低下している症例には禁忌

抗がん剤治療を受けられる方へ
＜化学療法治療計画書および同意書＞

様


健和会大手町病院外科・消化器科

胃癌の治療に対して貴方の受けられる治療は、
TS-1/CDDP + ハーセプチン 療法です

◎抗がん剤注射の前に吐き気を押さえる点滴をします

◎CDDPの点滴日(1日目)は、点滴の量が多いので入院治療が必要です。

◎抗がん剤投与スケジュール(1クール)



◎この治療を 1クール行う予定です。

◎主な副作用

1. 骨髄抑制(白血球減少、好中球減少)
2. 貧血(ヘモグロビン減少)
3. 悪心・嘔吐
4. 食欲不振
5. 下痢症
6. 腎機能障害(予防のため24時間の点滴を行います)
7. ハーセプチン特有の副作用

infusion reaction : 発現率は40%。初回のハーセプチン投与中または投与開始後24時間以内に多く現れる悪寒・発熱などの症状で、過敏反応と考えられています。

※副作用症状が軽度の場合は、十分な注意の上治療を継続いたします。

※副作用が強く急激な変化を認めた場合は、中止もしくは延期いたします。

説明日 年 月 日

説明医師 _____ 担当看護師 _____

この抗がん剤治療に関して、必要性、スケジュール内容、副作用を十分理解の上、治療を受けることに同意いたします。

同意日 年 月 日 患者様氏名 _____