

# 化学療法スケジュール表(汎用版)

健和会大手町病院( )科

No.1

担当医師

看護師

患者氏名		歳	ID
------	--	---	----

薬剤部

疾患名

平滑筋肉腫

切除不能癌

再発・転移

身長	cm	体重	kg	体表面積	m2
----	----	----	----	------	----

## 化学療法レジメン

**ゲムシタビン + ドセタキセル (GEM/DTX)**

ゲムシタビン GEM (ジェムザール)	1000mg/m2	day 1 ↑	day 8 ↑	1週休薬
ドセタキセル DTX (タキソテール)	80mg/m2		↑	

薬剤投与量

目標 6~8サイクル

ジェムザール	mg/m2	mg/b
ワンタキソテール(タキソテール)	mg/m2	mg/b

化学療法開始日

年 月 日

同意書作成

注射投与経路

末梢血管確保

CVポート

薬剤	投与法	月/日							
		1サイクル		2サイクル		3サイクル		4サイクル	
		<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来
① グラニセトロン 1mg デキサート6.6mg ポラミン 1A	前投薬 30分点滴	○	○	○	○	○	○	○	○
② <b>ジェムザール</b> mg 生食 100ml	90分点滴	○	○	○	○	○	○	○	○
③ <b>ワンタキソテール</b> mg 生食 250ml	60分点滴		○		○		○		○

### ☆ 保険病名に関する注意

ジェムザール・タキソテールいずれも平滑筋肉腫には保険適応がない。  
従って、いずれの抗癌剤にも適応がある肺癌病名が必要。

- ※ 途中薬剤増減の変更の場合は、スケジュール欄内に変更した用量を記載する。
- ※ 途中薬剤中止の場合は、スケジュール欄内に中止と記載する。

# 化学療法スケジュール表(汎用版)

健和会大手町病院( )科

No.2

担当医師

看護師

患者氏名		歳	ID
------	--	---	----

薬剤部

薬剤	月/日	月/日									
		5サイクル		6サイクル		7サイクル		8サイクル		9サイクル	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院
		<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	
①	グラニセトロン 1キット デカドロン6.6mg ポララミン 1A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
②	ジェムザール mg 生食 100ml	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③	ワンタキソテール mg 生食 250ml		○		○		○		○		○

薬剤	月/日	月/日									
		サイクル		サイクル		サイクル		サイクル		サイクル	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院	<input type="checkbox"/> 入院
		<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	<input type="checkbox"/> 外来	
①	グラニセトロン 1mg デキサート6.6mg ポララミン 1A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
②	ジェムザール mg 生食 100ml	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
③	ワンタキソテール mg 生食 250ml		○		○		○		○		○

◎ レジメン参考資料 JSCO2010 岡山大学大学院緩和医療学 松岡順治ら

- ・平滑筋肉腫と診断され、前治療がある41症例で有効性と安全性を評価。
- ・奏効率 46% 病状制御率 83% CR 1例

副作用

脱毛、浮腫、疲労感、悪心・嘔吐、神経障害、肝機能障害、間質性肺炎  
血液毒性(好中球減少症、貧血、血小板減少症)

◎ ドセタキセル(タキソテール)の特徴的な副作用

浮腫 : 投与量が蓄積されるにつれて発生頻度が高まる。  
→ 胸水・腹水などのある患者には珍重な投与が必要。

- ・タキサン系で出現しやすい末梢神経障害はタキソール(パクリタキセル)より軽微。
- ・タキソールに特徴的な有痛性の筋肉症状は見られない。
- ・ドセタキセルによる白血球減少症は一過性のことが多い。