

疾患名 (がん 腫)	(がん 腫) 胃がん
------------------	------------------

療法 (レジメン) 名	ニボルマブ + CapeOX
-------------	----------------

番号	抗がん剤 (商品名) 【略語】	投与方法	1日投与量	(上限値)
1	生食50mL (ルート確保)	点滴 5分		
2	ニボルマブ (オプジーボ) 360mg/body 生食 100mL	点滴 30分		
3	生食50mL (フラッシュ用)	15分		
4	パロノセトロン0.75mg デキサメタゾン6.6mg	30分		
5	オキサリプラチン130mg/m ² 5%ブドウ糖液 500mL	2時間		
6	生食50mL (フラッシュ用)	15分		
7	ゼローダ (カペシタビン) (用量右記) day1-14 服用。 Day15-21は休薬		BSA < 1.36 : 8tab (2400mg) /day 分2 1.36 ≤ BSA < 1.66 : 10tab (3000mg) /day 分2 1.66 ≤ BSA < 1.96 : 12tab (3600mg) /day 分2 1.96 ≤ BSA : 14tab (4200mg) /day 分2	
投与スケジュール		特有の副作用		
1コース21日間				

※投与量の単位 : mg/m²、mg/body、mg/kg

※レジメンの妥当性を評価できる資料を添付の事(添付資料についての詳細は裏面に参照)


※投与スケジュール、特有の副作用については、該当する場合のみ記載

根拠文献①Lancet Oncol. 2022 Feb;23(2):234-247


根拠文献② : Lancet. 2021 Jul 3;398(10294):27-40

ニボルマブ+SOX

フィルター付きルート

ルート1	ルート2	ルート3
①5分 (ルート確保) 生食 50mL		
②30分 オプジーボ 360mg		
③15分 (フラッシュ) 正糖50mL		
④30分 パロ/セトロン デキサメタゾン		
		
	⑤2時間 オキサリプラチン 5%ブドウ糖	
⑥フラッシュ 生食 50mL		

カベンダピン
BSA<1.36 : 8tab (2400mg) /day 分2
1.36≧BSA<1.66 : 10tab (3000mg) /day 分2
1.66≧BSA<1.96 : 12tab (3600mg) /day 分2
1.96≧BSA : 14tab (4200mg) /day 分2



フィルター付きルート